

Доклад от сообщества по результатам исследования EMIS-2017, второй выпуск Ноябрь 2020

Европейское Интернет-Исследование среди МСМ (EMIS) – самое масштабное международное многоязычное исследование среди геев, бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), проведенное с октября 2017 по конец января 2018 года. Это второй выпуск доклада от сообщества, в котором мы хотели бы дать вам свою обратную связь.


КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 13,000 ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ РЕСПОНДЕНТОВ В 48 СТРАНАХ




Приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом в 2020 году, второй выпуск доклада от сообщества по результатам исследования EMIS-2017 базируется на ответах 13,172 (10%) мужчин, живущих с ВИЧ, в 48-ми странах мира. Огромная благодарность всем 137,000 мужчинам, участвовавшим в исследовании EMIS-2017. Данный доклад, страновые отчеты, а также первый выпуск доклада от сообщества, доступны по ссылке: www.emis2017.eu

ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ

% респондентов в исследовании EMIS-2017, у которых когда-либо была диагностирована ВИЧ-инфекция



КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ЖИЗНИ С ВИЧ



ГЕПАТИТЫ

65% прошли полный курс вакцинации от гепатита А

73% прошли полный курс вакцинации от гепатита В

22% У 22% когда-либо совместно диагностированы гепатит В и гепатит С

ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

96% из вас проходили обследование своей ВИЧ-инфекции за последние 6 месяцев

90% из вас находятся на лечении антиретровирусными препаратами (АРТ)

82% из вас имеют подавленную (неопределяемую) вирусную нагрузку

Каскад лечения ВИЧ показал лучшие результаты на севере и западе Европы по сравнению с югом и востоком Европы

ВОЗРАСТ, МИГРАЦИЯ, ПАРТНЕРСТВО

4%

14-24
года

36%

25-39
лет

45%

40-54
года

12%

55-64
года

3%

65+
лет

18% родились за рубежом

51% одиноки

7%

ответили: «Я не уверен, есть ли у меня постоянный партнер / Это сложно»

42% Имели постоянного партнера

Среди 42%, имевших постоянного партнера, у 43% был партнер с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

ГДЕ ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЗАНИМАЯСЬ СЕКСОМ С НЕПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ-МУЖЧИНОЙ



ИППП, ДИАГНОСТИРОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД



СЕКСУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ




ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О Н=Н


! 85%

ВИЧ-положительных мужчин знали о том, что ВИЧ-положительный человек с неопределяемой вирусной нагрузкой не может передать ВИЧ. Среди всех респондентов (согласно первому выпуску доклада от сообщества по результатам исследования EMIS-2017) 57% были осведомлены об этом факте. Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего продвижения информации о Н=Н среди геев и бисексуальных мужчин вообще и ВИЧ-положительных геев (и медицинских специалистов, предоставляющих им услуги), в частности.

ВАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ



СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ



Доклад от сообщества по результатам исследования EMIS-2017, второй выпуск
Ноябрь 2020

Европейское Интернет-Исследование среди МСМ (EMIS) – самое масштабное международное многоязычное исследование среди геев, бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), проведенное с октября 2017 по конец января 2018 года. Это второй выпуск доклада от сообщества, в котором мы хотели бы дать вам свою обратную связь.

СТРЕСС МЕНЬШИНСТВ

19%

из вас словесно оскорбляли за последний год

17%

из вас либо никому не говорили о своей сексуальной ориентации, либо открылись только нескольким людям

8%

из вас имели признаки серьезного беспокойства и депрессии

25%

думали о том, чтобы «навредить себе», или думали «лучше бы мне умереть»

Процент ВИЧ-позитивных мужчин, употреблявших наркотики за последний год



63%

употребляли попперсы



46%

употребляли вещества, используемые при эректильной дисфункции



34%

употребляли каннабис



23%

употребляли экстази в таблетках или порошке



21%

употребляли кокаин



16%

употребляли седативные препараты / транквилизаторы

НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ

6%

из вас употребляли наркотики инъекционно (исключая стероиды) за последний год

17%

за последние 4 недели употребляли стимуляторы, чтобы сделать сексуальные ощущения более интенсивными или длящимися дольше

ПОДДЕРЖКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

! 18%

всех ВИЧ-позитивных респондентов имели признаки алкогольной зависимости, однако, только 12% из них консультировались с медицинским специалистом по вопросам своего употребления алкоголя.

! 10%

всех ВИЧ-позитивных респондентов были обеспокоены своим употреблением наркотиков, но только 21% из них консультировались с медицинским работником по поводу своего употребления наркотиков.